

## 5. OTROS CONSEJOS

### ¿Cuáles son las dosis habituales de fármacos para la fiebre o el dolor?

Fármaco	Dosis	Dosis máxima	Intervalo	Observaciones
Paracetamol	10-15 mg/kg/ dosis	60 mg/kg/día	Cada 4-6-8 horas	Vía oral o rectal No hay límite de edad
Ibuprofeno	5-10 mg/kg/ dosis	20 mg/kg/día	Cada 6-8 horas	Vía oral Mayores de 3 meses
Metamizol	10-15 mg/kg/ dosis	60 mg/kg/día	Cada 6-8 horas	Vía oral o rectal No en menores de 4 meses No supositorios en menores de 1 año

### ¿Cómo se calcula la dosis?

- Paracetamol gotas 100 mg/ml:  $\text{Peso (kg)} \times 0,15 = \text{ml por toma}$ .
- $\text{Peso (kg)} \times 0,10 = \text{ml por toma si se da cada 4 horas}$
- Ibuprofeno 2% jarabe 100 mg/5 ml (20 mg/ml):  $\text{Peso (kg)}/3 = \text{ml en cada toma}$ .
- Ibuprofeno 4% jarabe 200 mg/5 ml (40 mg/ml):  $\text{Peso (kg)}/6 = \text{ml en cada toma}$ .
- Metamizol gotas 500 mg/ml: 0,5 gotas/kg/dosis.

### Recursos

- Antitérmicos (para la fiebre). Familia y salud.
- Antitérmicos. En familia.
- Analgésicos, antitérmicos, antiinflamatorios. Guía prescripción pediátrica.