

Gripe

La **GRIPE** causa cada año una importante carga de enfermedad a nivel mundial y, de forma específica, en la población infantil. Supone un elevado número de visitas médicas a A.P, consumo de antibióticos, hospitalizaciones e, incluso, fallecimientos. La vacuna antigripal es la forma más efectiva de prevención de la gripe

Vacunas

Indicaciones

- **Población de 6 meses a 59 meses**
- **> 6 meses** pertenecientes a **grupos de riesgo** con mayor posibilidad de complicación de la enfermedad
- **> 6 meses** que sean **contacto estrecho** de personas de riesgo

Vacunas disponibles tetravalentes

-vacunas inactivadas i.m/sc a partir de 6 meses, cultivadas en huevo de gallina embrionado

-vacuna inactivada i.m a partir de 2 años, de cultivo celular

-vacuna atenuada intranasal 2-17 años, cultivada en huevo de gallina embrionado

*indicación por edad según comunidad autónoma

Posología

UNA dosis COMPLETA a todos los niños **EXCEPTO MENORES DE 9 años** de grupo de riesgo + **no registro** de **dos dosis previas** = DOS dosis separadas 4 semanas

Efectos adversos

- vacuna i.m: dolor o inflamación en el lugar de la inyección, fiebre, malestar y dolor muscular
- vacuna i.n: congestión nasal o rinorrea, disminución del apetito, malestar general, cefalea y pirexia

Contraindicaciones absolutas

<de 6 meses. Alergia grave a vacuna antigripal previa o a un componente distinto del huevo

Precauciones

Enfermedad febril o proceso agudo moderado/grave. Síndrome de Guillain-Barré. Púrpura trombopénica inmune
Alergia grave al huevo (30')

Coadministración

Se recomienda que las vacunas antigripales se coadministren con la vacuna frente a covid-19

(La mayoría de los pacientes vacunados por riesgo tienen indicadas ambas)

Se pueden coadministrar con el resto de vacunas del calendario vacunal

❖ VACUNA ATENUADA INTRANASAL

- Posología **0.2ml** (0.1ml por cada fosa nasal).
- **Contraindicada:** En pacientes **inmunosuprimidos**. Evitar, así mismo, contacto de inmunosuprimidos y niños vacunados dos semanas. En pacientes en tto con salicilatos (no dar hasta 4 sem después de la vacuna). Asma grave o Sibilancias activas. Fístula de LCR activa
- Se administra con el paciente erguido en posición vertical, respirando con normalidad. Aunque estornude, trague o, si se produce goteo, una dosis será suficiente

La recomendación de vacunación en las consultas de atención primaria es relevante en la toma de decisiones de las familias

Más información

- [Fichas Técnicas todas las vacunas de la gripe](#)
- Ministerio de Sanidad, Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones, 12 de septiembre de 2023. [Recomendaciones de vacunación frente a gripe y COVID-19 en la temporada 2023-2024 en España. Actualización](#)
- Ministerio de Sanidad. Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones, octubre de 2022. [Recomendaciones de vacunación frente a la gripe en población infantil de 6 a 59 meses](#)
- CAV-AEP: <https://vacunasaep.org/>